

nitida Mel., Trans. am. ent. Soc. XXVIII. 207, T. V. Fig. 10,
14, 21 (1902).

valdiviana Phil., Verh. zool. bot. Ges. Wien XV. 768, 1 (1865).
— America mer.

xanthopoda Will. = **gilvipes** Lw.

xanthopoda Will. 1896, p. 441 = **Tachista fulvida** (Will.)
Coquill.

xanthopyga Bezzi, Ann. Mus. nat. hung. II. 352, 33 (1904).
— N.-Guinea.

Es sind im ganzen 36 Arten bekannt, von denen wahrscheinlich
avena Walk. = *acnesceus* Wied. und *luteipes* Ol. = *flavipes* Macq.
sind. Von diesen 36 Arten gehören 14 dem paläarktischen Faunen-
gebiete an, 10 dem nearktischen, 2 dem neotropischen, 1 dem süd-
asiatischen, 8 dem australischen; eine Art (*acnesceus* Wied.) scheint
in Europa und Afrika (und Asien) weit verbreitet zu sein.

Abbildungen von Grottenkäfern aus Bosnien und der Herzegowina.

Von **Edm. Reitter** in Paskau (Mähren).

Hiezu Tafel I., Fig. 1 bis 9.

Erklärung der Figuren:

1. *Antroherpon Leonhardi* Reitt. Wiener Ent. Zeitg. 1902, 208.
(Herzegowina).
2. *Antroherpon Mutuliči* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903, 216. (Herzegowina).
3. *Antroherpon Loreki* Zoufal, Wien. Ent. Ztg. 1904, 20, vom
1. Februar.
= *A. Kraussi* Müll., Münch. Kol. Zeitschr. 1904. (II.) pg. 38,
vom 16. Februar.
4. *Pholeuonopsis Sequensi* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1902, 223, aus
dem nördlichen Teile von Bosnien.
5. *Anillocharis Ottonis* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903, 231. (Herzegowina).
6. *Leonhardella angulicollis* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903, 209.
(Herzegowina).
7. *Silphanillus Leonhardi* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903, 211. Herze-
gowina. Unter einem großen, tief in der Erde eingebetteten Steine
an der höchsten Stelle der Vlasulja entdeckt.
8. *Bathyscia (Aphaobius) curycnemis* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1904,
26. (Herzegowina).
9. *Anophthalmus Hilfi* Reitt. Wien. Ent. Ztg. 1903, 212. (Herzegowina).